

# Después de las vacunas...



## Cuidados posteriores a la vacuna

Después de vacunarse, su hijo puede necesitar que le des más amor y cuidado. Las vacunas mantienen a los niños a salvo de enfermedades graves, pero también pueden provocar que se sientan molestos durante un corto tiempo después de la aplicación de la vacuna.

**Las inyecciones pueden doler un poco, pero contraer la enfermedad puede ser mucho más doloroso!**

**Creo que mi hijo tiene calentura. ¿Qué debo hacer?**

- Si cree que su hijo tiene fiebre, puede ser porque la vacuna está haciendo efecto, o puede ser una infección en su organismo. La fiebre activa el sistema inmunológico, provocando un aumento en la temperatura corporal.
- Verifique la temperatura de su hijo siguiendo las instrucciones del termómetro o visitando "Cómo tomarle la temperatura a un niño" en [healthychildren.org](http://healthychildren.org).
- Si la temperatura es de 100.4° Fahrenheit (38° Celsius) o más, su hijo tiene fiebre.
- Dale a su hijo muchos líquidos.
- Viste a su hijo con ropa ligera. No lo tapes ni lo envuelvas demasiado.

Si la temperatura de su niño es de 102° Fahrenheit (38.9° Celsius) o más, o llora sin parar durante más de 3 horas, llame a su proveedor de inmediato.



**Advil**® **Motrin**

**TYLENOL**®

Estos medicamentos ayudan con la fiebre y el malestar:

- Acetaminofeno (nombre comercial, Tylenol) - Dura alrededor de 4 horas.
- Ibuprofeno (nombres comerciales, Advil, Motrin) - Dura alrededor de 6 horas.
- **No le dé aspirina a menores de 18 años ni ibuprofeno a niños menores de 6 meses, porque puede ser peligroso.**

La cantidad de medicamento para darle a su hijo se basa en su peso y su edad. Por favor consulta el envase del medicamento para decidir la cantidad

## Mi hijo tiene la pierna o el brazo rojo, caliente y/o hinchado donde le pusieron la vacuna. ¿Qué debo hacer?

- Coloca un paño limpio, húmedo y fresco encima de la zona adolorida para que esté más cómodo. Haz esto cada vez que sea necesario.
- Revisa esa zona cada día. Si no mejora después de 1 día, llame a su proveedor de atención médica.

Si su hijo tiembla, tiene contracciones o convulsiones, o no te puede responder, llame inmediatamente al 911.



**EISNER**  
**HEALTH**



[eisnerhealth.org](https://eisnerhealth.org)

[@EisnerHealth](https://www.facebook.com/EisnerHealth)

[@eisner\\_health](https://www.instagram.com/eisner_health)